

**AMBULATORIO VETERINARIO  
CROCE AZZURRA**

Via Fabrizi 67/a, 96010 Priolo Gargallo (SR)

Dir. San. Dott Daniele Zappulla

daniele.zapp82@gmail.com

Priolo Gargallo, 07-05-2020

Si certifica che in data odierna alle ore 17:40 sono pervenuti nella nostra struttura (Ambulatorio Veterinario Croce Azzurra) i signori: Uccellatore Illuminato, Iannitto Roberta, Fazzina Simona, Silluzio Samuele che hanno portato d'urgenza un cane riferendo che era stato trascinato da una vettura con una catena al collo per un chilometro e mezzo.

Alle ore 17:50 circa è arrivato in struttura il collega Fazzino Vito (veterinario convenzionato con il Comune di Priolo Gargallo).

Il soggetto è un cane, meticcio, maschio, di 9-10 anni, di 15kg di peso, sprovvisto di microchip.

Il cane si presenta in condizioni critiche, in stato di shock, estremamente dolorante. Il cane indossa una pesante catena di ferro al collo.

Alla visita clinica il cane presenta ferite lacero-contuse su varie parti del corpo, più gravi in corrispondenza delle zampe anteriori, in particolare sulla faccia dorsale del carpo, nella quale grandi porzioni dell'articolazione erano esposte. Cute, tendini e legamenti non sono più visibili.

L'articolazione della spalla destra presenta un'erosione dei tessuti che ha raggiunto la parte interna dell'osso (spongiosa subcondrale).

Su addome e arti posteriori si riscontrano ferite lacero contuse di gravità e spessore variabile. Inoltre sono visibili ematomi sulla faccia ventrale dell'addome.

La mandibola del cane risulta estremamente mobile alla manipolazione, si sospetta una frattura, verosimilmente riconducibile a trauma da stiramento.

Il polso è accelerato, la temperatura normale, le mucose sono pallide, di colore bianco perlaceo.

Dopo aver applicato una museruola il cane è stato incannulato e sono stati somministrati fluidi endovena: Ringer lattato (10 ml/kg/h). E' stata effettuata una terapia endovena: Metadone (0,2 mg/kg), Ceftriaxone (25 mg/kg) e Medetomidina cloridrato (10 ug/kg).

A causa dello stato ipotensivo non è stato possibile effettuare un prelievo ematico per lo svolgimento di un esame emocromocitometrico.

Si è proceduto all'esame radiografico della regione del collo e del torace: non si sono riscontrate fratture ma sono visibili detriti dell'asfalto su tutta la superficie corporea.

Mentre si effettuava l'esame radiografico il cane è andato in arresto respiratorio.

E' stata effettuata la procedura di rianimazione cardiopolmonare per alcuni minuti ma senza successo. Si valutava la morte cerebrale ma era ancora presente battito cardiaco quindi si è proceduto alla somministrazione del complesso Mebenzonio ioduro, Embutramide, Tetracaina cloridrato (Tanax).

Ora del decesso 18:10.